



## Poda de Clemátides

Según el cultivar, las Clemátides florecen desde varios tipos de crecimiento cada año. Una poda adecuada de las Clemátides promoverá la floración. Cuando las Clemátides no se podan correctamente, las flores se retrasarán o es posible que no florezcan hasta la siguiente temporada de crecimiento.

Las Clemátides se pueden dividir en grupos según sus características de floración y preferencias de poda. Recomendamos podar todas las Clemátides a aproximadamente 12 pulgadas dentro del primer año de plantación. Esto fomenta la formación de un sistema de raíces fuerte y promueve el desarrollo de nuevos brotes, lo que conduce a más flores. A continuación, se muestran los tres grupos de poda. Para identificar el grupo de poda de su Clemátide, consulte la lista en el reverso.

### Grupo 1: Floración en primavera

Los cultivares de Clematis en este grupo florecen en el crecimiento de la temporada anterior. Generalmente, se pueden dejar sin podar. Si es necesario podar, espere hasta que termine la floración y elimine solo los tallos débiles o muertos.



### Grupo 2: Floración repetida

Estos cultivares producen flores al principio de la temporada en el crecimiento de la temporada anterior y flores tardías en el nuevo crecimiento. En general, estos cultivares solo se podan para dar forma. A principios de la primavera (febrero o marzo), podar ligeramente por encima del primer par de yemas de hojas hinchadas nuevas, eliminando alrededor de 12 pulgadas de cada brote. También retire cualquier tallo muerto o débil en este momento.

### Grupo 3: Plantas que florecen en verano u otoño

Las variedades de este grupo florecen en el nuevo crecimiento de la temporada y suelen ser los cultivares más vigorosos. Poda todos los tallos principales a unos 3 pies del suelo en febrero o marzo, dejando al menos un par de yemas fuertes en cada tallo. También retire cualquier tallo muerto o débil en este momento.



**Consejo de Hinsdale Nurseries:** Si no está seguro de qué tipo de Clematis tiene, déjala crecer libremente durante uno o dos años y observe cómo florece. Luego podrá asignarla a un grupo.

# PODAR CLEMÁTIDES

<b>Grupo 2: Floración repetida</b>	
Chantilly	Gillian Blades
Cherokee	Kilian Donahue
Crystal Fountain	Multi Blue
Diamantina	Nelly Moser
Empress	Niobe
Henry	Sugar Candy

<b>Grupo 3: Flores de verano o otoño</b>	
Cassis	Mrs. Robert Brydon
Jackman	Rouge Cardinal
Comtesse de Bouchard	Sweet Autumn
Huldine	Ville de Lyon